

ソリクア®配合注ソロスター®を
はじめてお使いになる患者さんへ

ソリクア®配合注ソロスター®は、
持効型溶解インスリン製剤(ランタス®注)と
GLP-1受容体作動薬(リキシセナチド)の有効成分を
1本に配合した注射剤です。



持効型溶解
インスリン製剤
ランタス®注



■ ■



GLP-1受容体
作動薬
リキシセナチド

ソリクア®配合注ソロスター®

ランタス®注

リキシセナチド

1 ドーズ

=

1 単位


+

1 µg



医師や薬剤師に指示された用法・用量をきちんと守って正しく使いましょう。

▶ 投与のタイミング



朝食前
1時間以内

▶ 投与量



1日1回

ドーズです


▶ 中止するお薬

▶ 継続するお薬



他の糖尿病注射剤とのお取り間違えにご注意ください。

ソリクア®配合注ソロスター®の特徴



ペン本体は **グレー**、注入ボタンは **マゼンタ** です。

使用する前に必ず、
「ソリクア®配合注ソロスター®」であることを確認しましょう。



使い方は「取扱説明書」を
ご参照ください。

サノフィ 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

オペチコール24
☎ 0120-49-7010
ヨクナレ糖

デバイスの操作方法に関するご質問に、
専任のスタッフが24時間365日、いつでもサポートします。
わからないことや困ったことがある場合は、ご連絡ください。

治療についてのお問い合わせ先
(医療機関名等記入欄)