

弊社の糖尿病用注射剤の安定性について

サノフィ株式会社

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社の糖尿病用注射剤の安定性に関しては、未開封あるいは開封後、裏面の期間に大きな変化は認められていません。なお、ご使用の際は、破損・外観異常(浮遊物等)がないか、念のためご確認ください。異常が認められた場合にはご使用をお控えください。

なお、未開封(使用前)品は”凍結を避け、2～8℃の遮光保存”をお願いいたします。



当社の製品についてのお問合せ

医薬品関連

くすり相談室 0120-109-905 (フリーダイヤル) 月～金 9:00～17:00 (祝日・会社休日を除く)

糖尿病関連医療機器の操作方法

オペチコール 24 0120-497-010 (フリーダイヤル) 24 時間 365 日

	製品名	製剤写真	保管の条件 凍結や直射日光を避けること ※安定性試験(承認時評価資料)の結果による
インスリン アナログ製剤	ランタス®注ソロスター®		28 日 25℃以下
	ランタス®注カート		28 日 25℃以下
	ランタス®注 100 単位/mL		28 日 25℃以下
	アピドラ®注ソロスター®		28 日 25℃以下
	アピドラ®注カート		28 日 25℃以下
	アピドラ®注 100 単位/mL		28 日 25℃以下
	インスリン リスプロ BS 注 ソロスター®HU「サノフィ」		28 日 30℃以下
	インスリン リスプロ BS 注 カート HU「サノフィ」		28 日 30℃以下
	インスリン リスプロ BS 注 100 単位/mL HU「サノフィ」		28 日 30℃以下
	インスリン アスパルト BS 注 ソロスター®NR「サノフィ」		28 日 30℃以下
	インスリン アスパルト BS 注 カート NR「サノフィ」		28 日 30℃以下
	インスリン アスパルト BS 注 100 単位/mL NR「サノフィ」		28 日 30℃以下
	ランタス®XR 注ソロスター®		42 日 25℃以下
持効溶解型インスリン アナログ製剤/ GLP-1 受容体作動薬 配合製剤	ソリクア®配合注ソロスター®		31 日 25℃以下
GLP-1 受容体作動薬	リキスミア®皮下注 300 μg		30 日 25℃以下